



SANATORIO OTAMENDI

CONSENTIMIENTO INFORMADO LITOTRICIA EXTRACORPÓREA

Fecha

Yo, DNI autorizo al Dr. y/o médicos que formen parte de su equipo y/o los por él seleccionados, realizar en mi persona la práctica conocida como **LITOTRICIA EXTRACORPÓREA**.

Declaro haber sido informado acerca de mi estado de salud concluyendo que presento una litiasis renal / ureteral, del lado derecho / izquierdo, con / sin infección urinaria (he tachado lo que no correspondía). Se me ha informado además acerca de mis antecedentes médicos.

Información del Procedimiento

Descripción: Consiste en la fragmentación de cálculos urinarios mediante ondas de choque (litotritor). Los fragmentos del cálculo son eliminados por la orina de forma espontánea. Esta técnica es actualmente el método ideal para el tratamiento de la mayoría de los cálculos debido a su fácil aplicación, su reducido índice de complicaciones y su carácter poco invasivo, respecto de la cirugía clásica.

Objetivo: Eliminación de los cálculos urinarios o la reducción de su tamaño.

Alternativas razonables: Tratamiento médico, cirugía abierta o percutánea. En mi caso se me ha explicado que la mejor opción es la litotricia extracorpórea. De no aceptar la indicación existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de los síntomas o sus enfermedades de base. Las complicaciones posibles que pudieran suceder son en buena parte imprevisibles, incluyendo el riesgo vital.

Riesgos: Los efectos secundarios o las complicaciones son posibles, pero poco frecuentes, a saber:

- Reacción alérgica a la medicación intravenosa, que puede llegar al shock anafiláctico
- Náuseas y vómitos, que pudieran requerir la hospitalización
- Sangrado por orina transitorio, hematoma renal o peri renal que puede requerir embolización.
- Dolor, enrojecimiento o hematoma en la zona donde penetran las ondas de choque
- Cólico nefrítico debido a la obstrucción de la vía urinaria por fragmentos de cálculo
- Obstrucción urinaria ureteral por fragmentos de cálculos que pueden requerir maniobras complementarias
- Infección urinaria
- Hipertensión arterial
- Alteración, disminución o pérdida de la función renal

De requerirse la introducción de un catéter para impedir la obstrucción del riñón, este suele ser bien tolerado pero puede producir a veces dolor, sangrado, infección urinaria y, rara vez, infección generalizada, rotura ureteral u otras de más difícil predicción

Algunas complicaciones pueden evolucionar tórpidamente y ocasionar la muerte

Contraindicaciones y advertencias: Debido al riesgo de irradiación fetal es imprescindible descartar el estado de embarazo en mujeres de edad fértil. Es necesario que informe sobre el consumo de medicamentos que actúen sobre la coagulación de la sangre (antiagregantes u otros) para indicar su suspensión. Debe informar también sobre alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, renales, metabólicas, inmunológicas, etc., existencia de prótesis, marcapasos medicaciones actuales y cualquier otra circunstancia que pudiera complicar la intervención o el postoperatorio.

Firma del paciente

Aclaración



SANATORIO OTAMENDI

CONSENTIMIENTO INFORMADO LITOTRIZIA EXTRACORPÓREA

Fecha

Firma del médico

Aclaración

En caso que el paciente no pudiera firmar aclarar causa:

Firma del acompañante

Aclaración

REVOCAION/RECHAZO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

En el día de la fecha .../.../..... a las:..... horas, yo,
revoco/rechazo el presente consentimiento habiendo sido debidamente informado por el médico tratante de las consecuencias médicas de la NO realización del procedimiento descrito en el mismo. Asumo expresamente la responsabilidad y las consecuencias por la decisión que he tomado.

Firma del Paciente o Representante /Aclaración/ Nro. Documento

Firma y sello del Médico

2/2

Rev. 00 Vig. 11/2023